Manualisierte psychosoziale Interventionen Motivationale Gesprächsführung bei Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen

Oliver Scheibenbogen

4. Interdisziplinäres Symposium zur Suchterkrankung
8.3.2014 Grundlsee

Inhalt

- Vom richtigen Zeitpunkt!
Das Drehtürmodell zur Behandlungsmotivation
(Prochaska & DiClemente)
- Vom gesunden und alkoholischen Teil!
Das innere Zwiegespräch nutzen!
- Grundlagen des Motivational Interviewings
(Miller & Rollnick, 2002)

Behandlungsziele

Behandlungsziel der (Alkohol-) Abhängigkeit

Erniedrigung für Alkohol

Der Totalausfall

Behandlung

Die Alkoholkrankheit
kann nicht geheilt,
sondern nur stabilisiert
werden

Der Suchtmechanismus
schläft nur - der Patient
allein kann ihn wieder
aufwecken

Therapiemotivation

Für die Therapie von Abhängigen gilt in besonderer Weise, dass die **Behandlungsmotivation selbst zum Gegenstand therapeutischer Bemühungen gemacht werden muss.**

Drehtür- Modell zur Behandlungsmotivation

nach Prochaska & DiClemente

Stufen der Veränderung

Modell nach Prochaska und DiClemente

Der Vorteil dieses Modells besteht darin, die therapeutischen Interventionen auszurichten an den für die Phase

- typischen Ziele und
- typischen Motivationsprozesse

Drehtür- Modell zur Behandlungsmotivation

nach Prochaska & DiClemente

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG
ANTON-PROKSCH-INSTITUT

Stufen der Veränderung

Modell nach Prochaska und DiClementi

Stufe	Patientenverhalten	Handlungsmöglichkeit des Therapeuten
Vorabsicht	trinkt heimlich leugnet bagatellisiert oder rationalisiert sein Alkoholproblem	Man muss sich hier klar werden, welche Bedürfnisse der Patient hat und welche der Therapeut hat
Pre- Contemplation	Meist keine Problemeinsicht vorhanden, gefangen in der Alkoholkompetenz Keine Änderungsmotivation	Zunächst möglichst nur zuhören! Fragen stellen!

Drehtür- Modell zur Behandlungsmotivation

nach Prochaska & DiClemente

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG

ANTON-PROKSCH-INSTITUT

Stufen der Veränderung

Modell nach Prochaska und DiClementi

Stufe	Patientenverhalten	Handlungsmöglichkeit des Therapeuten
Absicht	<p>Entwicklung von Problem- bewusstsein und Therapie- motivation so kann es mit dem Trinken nicht weitergehen reagiert aber auf Konfrontationen aus seinem sozialen Umfeld mit Ablehnung starke Ambivalenzen Entscheidungen sind labil</p>	<p>Motivationsfördernde Maßnahmen und Stärkung von Selbstwirksamkeit Diskussion von Veränderungs- Strategien <u>zu früh:</u> Überredung zu Therapien führt zu instabilen Änderungen</p>
Contemplation		

Erhöhung der „self-efficacy“

(Bandura, 1977)

Erhöhung der „self-efficacy“

(Bandura, 1977)

Drehtür- Modell zur Behandlungsmotivation

nach Prochaska & DiClemente

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG

ANTON-PROKSCH-INSTITUT

Stufen der Veränderung

Modell nach Prochaska und DiClementi

Stufe	Patientenverhalten	Handlungsmöglichkeit des Therapeuten
Entscheidung	Erste Versuche zeitweise abstinent zu leben. Trinken nur zu bestimmten Gelegenheiten „Trinksysteme“	Konkrete Hilfe geben, indem das Behandlungskonzept genau erläutert wird. Patient beginnt, Experte seiner Erkrankung zu werden
Decision	Das Scheitern dieser Versuche kann dazu führen, dass jetzt Hilfe gesucht wird	<u>zu früh:</u> thematisieren des grundlegenden Lebensstils

Bedenken Sie, dass dem Betroffenen der Verzicht auf Alkohol und das Akzeptieren der Sucht seine ganze Kraft abverlangt.

Belastende Analysen von kritischen Momenten des Lebenslaufes stellen jetzt eine Kontraindikation dar.

Stützende Gespräche, Ermunterung und Konzentration auf die Sucht stehen jetzt im Vordergrund.

Drehtür- Modell zur Behandlungsmotivation

nach Prochaska & DiClemente

Exit
Patient nicht zur
Änderung bereit

Stufen der Veränderung

Modell nach Prochaska und DiClementi

Stufe	Patientenverhalten	Handlungsmöglichkeit des Therapeuten
<p>Handlung</p> <p>Action</p>	<p>Ernsthafter Abstinenzvorsatz Suchen von Unterstützung oft niedrigschwellig in Selbsthilfegruppen Trotzdem noch Misserfolge, die das Selbstwertgefühl, die Selbstwirksamkeitserwartung belasten Daraus folgt jedoch schließlich eine intensivere Suche nach Hilfe</p>	<p>Konkrete Beratung und rasche Unterstützung</p> <p>Analyse der Funktion des Alkohols und Erarbeiten von Copingstrategien</p> <p>Informieren statt belehren</p> <p>Verständnis für die ambivalenten Gefühle</p>

Drehtür- Modell zur Behandlungsmotivation

nach Prochaska & DiClemente

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG

ANTON-PROKSCH-INSTITUT

Stufen der Veränderung

Modell nach Prochaska und DiClementi

Stufe	Patientenverhalten	Handlungsmöglichkeit des Therapeuten
Erfolg halten	<p>Umsetzung der in der Therapie erarbeiteten Einsichten und neuen Reaktionen</p> <p>Wieder Übernehmen von Verantwortung und</p>	<p>Auffrischen der bereits erarbeiteten Schritte und anwenden auf Alltags-Schwierigkeiten</p>
Maintenance	<p>Mitentscheidung im sozialen Umfeld</p> <p>Probleme mit dem „neuen Leben“</p>	<p>Motivieren und loben</p> <p>Gespräche mit Familie</p> <p>Wachsam bleiben</p> <p>evtl. Alkoholtests</p> <p>Notfallplan</p>

Drehtür- Modell zur Behandlungsmotivation

nach Prochaska & DiClemente

Drehtür- Modell zur Behandlungsmotivation

nach Prochaska & DiClemente

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG

ANTON-PROKSCH-INSTITUT

Exit
Ziel erreicht

Exit
Patient nicht zur
Änderung bereit

Stufen der Veränderung

Modell nach Prochaska und DiClementi

Stufe	Patientenverhalten	Handlungsmöglichkeit des Therapeuten
Rückfall	<p>Erneuter Konsum von Alkohol bei Problemen</p> <p>Häufig „testen“ ob Alkohol noch ein Problem ist</p> <p>Schamgefühle und meiden der Behandlung</p>	<p>Keine Vorwürfe, sondern therapeutische Allianz</p> <p>Keine Wartezeiten für nächsten Termin</p> <p>Mittels Sokratischem Dialog Lehren aus dem Rückfall ziehen</p>
Relapse	<p>Will allein mit dem Rückfall fertig werden</p>	<p>Evtl. Vermitteln einer Entzugsbehandlung</p>

Lösung des Problems:

Arbeiten mit Teilen

Es gibt einen **alkoholischen Teil**, dem man die Schwächen und Fehleinschätzungen zuordnen kann

und

Es gibt einen **gesunden Teil**, mit dem der Therapeut/
Arzt eine Allianz bilden kann, um den alkoholischen Teil
zu bekämpfen.

Inneres Zwiegespräch

Welcher Teil von Ihnen spricht die folgenden Sätze ?

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG

ANTON-PROKSCH-INSTITUT

Gesunder Teil

Alkoholischer Teil

Komm Du musst ja nicht so viel trinken. Wegen 2 Bier kotzt Du ja nicht gleich !.

Ich mag nicht mehr in der Früh über der Kloschüssel erbrechen und mich zum Sterben elend fühlen !

Damals, als Du getrunken hast, waren ja nur Deine Probleme schuld. Jetzt hast Du ja keine Probleme. Mach doch mal einen Test mit einem kleinen Bier- das kann doch jetzt nicht mehr schaden !

Ich möchte nie wieder meinen kleinen Sohn weinen sehen, nur weil ich Alkohol getrunken habe !

Wenn ich damals weitergesoffen hätte, wäre ich jetzt nicht hier !

Du hast jetzt schon lange kein Achterl mehr getrunken – Du hast es eh im Griff !

Mein Ansehen verkaufe ich nicht für 1 Bier !

Widerstandsphänomene

- „Arguing“: Der Patient stellt die Kompetenz des Therapeuten in Abrede.
- „Interrupting“: Der Patient schneidet dem Therapeuten das Wort ab.
- „Negating“: Der Patient leugnet od. bagatellisiert sein Alkoholproblem, lehnt Hilfestellungen destruktiv ab.
- „Ignoring“: Patient wird unaufmerksam und versucht dem Gespräch eine andere Richtung zu geben.

(Miller und Rollnick, 2002)

ad Vorgehensweise -

*„Die Fürsorge schuldet den Versuch,
nicht den Erfolg!“*

- Ich sage meinem Patienten, wie ich es im Moment erlebe und was mir aufgefallen ist.
Was mein Gegenüber mit dieser Mitteilung macht, ist letztlich seine Entscheidung.
- Ich stelle die Auffälligkeiten in Zusammenhang mit dem vermuteten riskanten Alkoholkonsum.
Ob mein Gegenüber dieses genauso sieht, ist seine Sache.

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG

ANTON-PROKSCH-INSTITUT

ad Vorgehensweise -

Gesprächshinweise I

- Sorgen Sie für eine möglichst ruhige und ungestörte Gesprächssituation.
- Beginnen Sie das Gespräch mit einer positiven Rückmeldung.
- Wählen Sie ein realistisches Ziel, das Sie erreichen können, zum Beispiel:
 - Ein erstes Sensibilisieren für das Thema
 - Fachliche Informationen vermitteln
 - Erste Symptome/ somatische Erkrankungen in Verbindung zum gesteigerten Alkoholkonsum bringen
 - Hilfe anbieten und weiter zu überweisen
 - einen weiteren Termin vereinbaren

ad Vorgehensweise -

Gesprächshinweise II

- Lassen Sie sich die Gesprächsführung nicht aus der Hand nehmen!
- Lassen Sie sich nicht vorschnell in Diskussionen über die Diagnose „Alkoholabhängigkeit“ verwickeln!
- Eine Liste mit Beratungsstellen sollte zur Verfügung stehen.

ad Vorgehensweise -

Gesprächshinweise III

- Lassen Sie sich nicht in eine Eskalation verwickeln, wie zum Beispiel: Patient:

„Sie haben ein Alkoholproblem!“

„Nein, habe ich nicht. Sie irren sich!“

„Ich irre mich nicht!“

„Doch!“ ... „Nein!“ ... „Doch!“ ...

- Sie können stattdessen mit folgender Formulierung reagieren:

„Ich sehe da einen deutlichen Zusammenhang zwischen ihrer Gastritis und den von Ihnen gerade geäußerten Alkoholkonsum.“

ad Vorgehensweise -

Gesprächshinweise IV

- Beenden Sie das Gespräch mit einer **Zusammenfassung** der wichtigsten Punkte und einer festen **Vereinbarung über weitere Maßnahmen** .
- Vereinbaren sie einen Folgetermin!

Komponenten des Motivational Interviewings

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG

ANTON-PROKSCH-INSTITUT

Kommunikationsstrategie

Wichtigkeit

Offene Fragen stellen

- Trinken Sie Alkohol?
- Was gefällt Ihnen daran?
- Was denken Sie über Ihren Alkoholkonsum?
- Welche Veränderungen sind Ihnen aufgefallen?

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG

ANTON-PROKSCH-INSTITUT

Aktives Zuhören

Patient: „Ich habe manchmal Angst, dass ich vielleicht mehr trinke als gut für mich ist“

Arzt: „Sie haben in letzter Zeit ziemlich viel getrunken?“

Patient: „Ich will einfach keine Tabletten nehmen. Ich sollte das alleine in den Griff bekommen“

Arzt: „Sie glauben nicht, dass Medikamente Ihnen helfen können? Sie wollen sich nicht nur auf Medikamente verlassen?“

Bestätigen: Wertschätzung und Würdigung ausdrücken

- „Es muss schwer für Sie gewesen sein, überhaupt zu kommen.“
- „Es war ein großer Schritt für Sie, sich das Alles so deutlich einzugestehen.“
- „Es beeindruckt mich, wie sehr Ihnen Ihre Familie am Herzen liegt.“

Change-Talk hervorrufen

- Bewertung der Wichtigkeit der Veränderung (z.B. auf einer Skala)
- Explorieren der Entscheidungswaage
- extreme Entwicklungen erfragen
- Zukunftsbilder erfragen
- zurückblicken
- Ziele und Werte ergründen

Veränderungsambivalenz (Entscheidungswaage)

Gründe für
Veränderung

Gründe
gegen
Veränderung

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG

ANTON-PROKSCH-INSTITUT

Antworten auf Widerstand

Patient: „Was glauben Sie denn wer Sie sind, dass Sie mir Ratschläge erteilen können? Was wissen Sie schon von meinen Problemen? Sie haben sicher keine Sorgen!

Arzt: „Es ist schwer vorstellbar, dass ich Sie verstehen kann ...“

oder:

„...das hört sich an als seien Sie wütend auf mich.“

Zusammenfassen

- Die wichtigsten Pro- und Kontra-Argumente zusammenfassen
- Patient kann sich mehrfach mit diesen Argumenten auseinandersetzen
- sie entfalten größere Wirkkraft

KLINIKUM
AKADEMIE
FORSCHUNG

ANTON-PROKSCH-INSTITUT

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

oliver.scheibenbogen@api.or.at